

種類		対象	標準的な接種期間	接種回数	種類	対象	標準的な接種期間	接種回数	
ロタウイルス 感染症	1価	生後6週～ 生後24週0日に 至るまで	初回接種の開始は、 生後2カ月～生後14週 6日まで	2回 ・2回目は27日以上の間隔を おいて生後24週までに完了	麻しん 風しん	1期	生後12カ月～24カ月に 至るまで	1回 ・1歳になったらできるだけ 早く接種する	
	5価	生後6週～ 生後32週0日に 至るまで		3回 ・2回目、3回目は27日以上 の間隔を置いて生後32週 までに完了		2期	小学校就学前の1年間 (令和2年4月2日～令和3年 4月1日生まれ)	1回	
B型肝炎		1歳に至るまで	生後2カ月～9カ月に 達するまでの期間	3回 ・1回目と2回目の間隔を27 日以上、1回目と3回目の 間隔を139日以上おいて 接種	水痘		生後12カ月～36カ月に 至るまで	初回接種は生後12カ 月～15カ月に達するま での期間 2回 ・3か月以上の間隔をお く 標準的には6か月から12 か月までの間隔をおく	
小児の肺炎球菌 感染症		生後2カ月～ 5歳に至るまで	初回接種の開始は、 生後2カ月～7カ月に 至るまで	接種開始年齢により 回数が異なる	日本脳炎	1期	生後6カ月～ 7歳6カ月に 至るまで	[初回] 3歳 標準的には6日以上28 日までの間隔をおく [追加] 4歳 ・初回接種終了後6カ 月以上の間隔をおく 標準的にはおおむね1 年の間隔をおく	
【五種混合】 ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ ヒブ(Hib)	1期	生後2カ月～ 7歳6カ月に 至るまで	[初回] 生後2カ月～7カ月に 達するまでの期間	[初回] 3回 ・20日以上の間隔をお く 標準的には56日までの 間隔をおく			2期	9歳以上 13歳未満	9歳
			[追加] 初回接種終了後 6カ月～18カ月に 達するまでの期間	[追加] 1回 ・初回接種終了後6カ 月以上の間隔をおく	【二種混合】 ジフテリア 破傷風	2期	11歳以上 13歳未満	11歳	1回
BCG		1歳に至るまで	生後5カ月～8カ月に 達するまでの期間	1回	ヒトパピローウイルス 感染症 (子宮頸がん予防)		小学6年生～ 高校1年生相当 の女子	中学1年生相当 ※キャッチアップ終了	接種開始年齢により、 回数が異なる

次の人は、「さんて郡山」までお問い合わせください

1. 市外の医療機関で接種する場合
(接種前の手続きが必要です。詳細は右のQRコードを参照してください)
2. 長期にわたり療養を必要とする病気など、特別の事情があることにより
定期予防接種を対象年齢内に受けることができなかった人

市外接種についてはこちら⇒



日本脳炎予防接種の特例措置について(接種費用:無料)

平成7年4月2日～平成19年4月1日に生まれた人は、特例措置として20歳未満までに接種ができます。

- ・1期を3回接種していない人は、不足回数を接種。
- ・積極的勧奨を差し控えていたために接種を受けなかった人は、母子健康手帳で接種回数を確認してください。

大和郡山市保健センター「さんて郡山」

TEL 0743-58-3333

子どもの予防接種についてはこちら⇒

